



Serviço Médico-Veterinário

Leishmaniose



◆ A causa:

- A Leishmaniose é causada por um protozoário (parasita), *Leishmania infantum*, transmitido de cão a cão ou de cão ao Homem, através da picada de um **insecto** (flebotomo).
- A actividade destes insectos é principalmente nocturna, estendendo-se do entardecer até ao amanhecer. Em Portugal, os flebotomos estão activos entre os meses de Maio a Outubro, dependendo das condições climáticas.

◆ Sinais clínicos:

- Emagrecimento, fraqueza geral, apatia e febre
- **Lesões cutâneas**, não pruríticas, nem dolorosas
- **Queda de pêlo e seborreia seca** nas orelhas, zona periorcular, extremidades e dorso
- **Crescimento exagerado das unhas**
- **Dermatites ulcerativas** no prepúcio e na boca
- Corrimento nasal sanguinolento



◆ Diagnóstico:

- Existem vários tipos de testes de diagnóstico para a Leishmaniose Canina. A grande maioria implica a colheita de uma amostra de sangue.

◆ Prevenção da doença:

- O programa de vacinação consiste na administração de três injeções após os seis meses de idade do cão, e uma revacinação anual;
- Uso de produtos que diminuem as picadas do flebotomo nos cães como inseticidas: sprays, coleiras ou pipetas.
- Evitar os passeios entre o entardecer e o amanhecer.
- Uma boa alimentação (ração), a vacinação e a desparasitação regulares são outras medidas de prevenção que ajudam o seu cão.